Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	07.05.2005	**Код замовлення:**	-
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:**	25.09.2026 9:56

Коментарі:

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG Первинна проба: венозна кров	<0.6 негативний	Од/мл	< 7	<7 негативний 7-10 сумнівний >10 позитивний
Метод ELIA				

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної імунології та алергології Пшенична І.В.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Що таке співвідношення імовірності (CI)?

CI, пов'язаний з відсутністю або наявністю захворювання			
CI-	**Виключення захворювання** Співвідношення імовірності нижче 1,0 (CI-) свідчить про те, наскільки зменшується ймовірність захворювання, якщо тест негативний. Чим нижче CI-, тим більша імовірність відсутності захворювання.	< 0.1	Високий зв'язок із відсутністю захворювання
		0.1 - 0.2	Помірний зв'язок із відсутністю захворювання
		0.2 - 0.5	Слабкий зв'язок із відсутністю захворювання
		0.5 - 2	Відсутність зв'язку з хворобою
CI+	**Підтвердження захворювання** Співвідношення ймовірності вище 1 (CI+) свідчить про те, наскільки збільшується імовірність захворювання, якщо тест позитивний. Чим вище CI+, тим більша імовірність захворювання.	2 - 5	Слабкий зв'язок із наявністю захворювання
		5 - 10	Помірний зв'язок із наявністю захворювання
		> 10	Високий зв'язок із наявністю захворювання

Целіакія

	Інтервал результатів	CI	95% ДІ	Зв'язок з целіакією
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELIA	< 7 U/ml	**0.19**	0.14 - 0.27	У 5,26 разів більша ймовірність виявлення у пацієнтів без целіакії, ніж у пацієнтів з целіакією
	7 - 21 U/ml	**7.40**	3.4 - 16.2	У 7,4 разів частіше зустрічається у пацієнтів із целіакією, ніж у пацієнтів без целіакії
	21 - 70 U/ml	**200**	28 - 1452	У 200 разів більша ймовірність виявлення у пацієнтів із целіакією, ніж у пацієнтів без целіакії
	> 70 U/ml	**506**	71 - 3608	У 506 разів частіше зустрічається у пацієнтів із целіакією, ніж у пацієнтів без целіакії

Література: Oyaert M. Clin Chem Lab Med 2015; 53:1537-1546.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*