

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 07.11.2003	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 11.09.2026 12:31
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Антитіла до гліадину (деамінізовані пептиди) IgA	0.7 негативний	Од/мл	< 7 7-10 >10	негативний сумнівний позитивний
Первинна проба: венозна кров				
Метод ELIA				

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної імунології та алергології Пшенична І.В.



Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Що таке співвідношення імовірності (CI)?

CI, пов'язаний з відсутністю або наявністю захворювання			
CI-	Виключення захворювання	< 0.1	Високий зв'язок із відсутністю захворювання
	Співвідношення імовірності нижче 1,0 (CI-) свідчить про те, наскільки зменшується ймовірність захворювання, якщо тест негативний. Чим нижче CI-, тим більша ймовірність відсутності захворювання.	0.1 - 0.2	Помірний зв'язок із відсутністю захворювання
		0.2 - 0.5	Слабкий зв'язок із відсутністю захворювання
		0.5 - 2	Відсутність зв'язку з хворобою
CI+	Підтвердження захворювання	2 - 5	Слабкий зв'язок із наявністю захворювання
	Співвідношення ймовірності вище 1 (CI+) свідчить про те, наскільки збільшується ймовірність захворювання, якщо тест позитивний. Чим вище CI+, тим більша ймовірність захворювання.	5 - 10	Помірний зв'язок із наявністю захворювання
		> 10	Високий зв'язок із наявністю захворювання

Целіакія

Антитіла до гліадину (деаміновані пептиди) IgG ELIA	Інтервал результатів	CI	95% ДІ	Зв'язок з целіакією
	< 7 U/ml	0.11	0.07 - 0.17	У 9,1 разів більше ймовірності виявлення у пацієнтів без целіакії, ніж у пацієнтів з целіакією
	7 - 21 U/ml	7.0	4.2 - 11.7	У 7 разів частіше зустрічається у пацієнтів із целіакією, ніж у пацієнтів без целіакії
	21 - 70 U/ml	81	25 - 259	Ймовірність виявлення у пацієнтів із целіакією у 81 раз вище, ніж у пацієнтів без целіакії
	> 70 U/ml	> 81	> 259	Усі особи з результатом тесту ELIA GliadinDP IgG > 70 U/ml мали целіакію

Література: Oyaert M. Clin Chem Lab Med 2015; 53:1537-1546.