

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 14.05.2002	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 23.09.2026 9:59
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Комплекс №90 "Первинний скринінг целиакії"				
Антитіла до тканинної трансглутамінази IgA Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	0.5 негативний	Од/мл	< 7 7-10 >10	негативний сумнівний позитивний
Антитіла до тканинної трансглутамінази IgG Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	<0.6 негативний	Од/мл	< 7 7-10 >10	негативний сумнівний позитивний
Імуноглобулін А Первинна проба: венозна кров	2.56	г/л	0,70 - 4,00	

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної імунології та алергології Пшенична І.В.



Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а
🌐 [dila.ua](#)

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

Що таке співвідношення імовірності (CI)?

CI, пов'язаний з відсутністю або наявністю захворювання			
CI-	Виключення захворювання	< 0.1	Високий зв'язок із відсутністю захворювання
	Співвідношення імовірності нижче 1,0 (CI-) свідчить про те, наскільки зменшується ймовірність захворювання, якщо тест негативний. Чим нижче CI-, тим більша ймовірність відсутності захворювання.	0.1 - 0.2	Помірний зв'язок із відсутністю захворювання
		0.2 - 0.5	Слабкий зв'язок із відсутністю захворювання
		0.5 - 2	Відсутність зв'язку з хворобою
CI+	Підтвердження захворювання	2 - 5	Слабкий зв'язок із наявністю захворювання
	Співвідношення ймовірності вище 1 (CI+) свідчить про те, наскільки збільшується ймовірність захворювання, якщо тест позитивний. Чим вище CI+, тим більша ймовірність захворювання.	5 - 10	Помірний зв'язок із наявністю захворювання
		> 10	Високий зв'язок із наявністю захворювання

Целіакія

Антитіла до тканинної трансглутамінази IgA ELISA	Інтервал результатів	CI	95% ДІ	Зв'язок з целіакією
	< 7 U/ml	0.19	0.14 - 0.27	У 5,26 разів більша ймовірність виявлення у пацієнтів без целіакії, ніж у пацієнтів з целіакією
	7 - 21 U/ml	7.40	3.4 - 16.2	У 7,4 разів частіше зустрічається у пацієнтів із целіакією, ніж у пацієнтів без целіакії
	21 - 70 U/ml	200	28 - 1452	У 200 разів більша ймовірність виявлення у пацієнтів із целіакією, ніж у пацієнтів без целіакії
	> 70 U/ml	506	71 - 3608	У 506 разів частіше зустрічається у пацієнтів із целіакією, ніж у пацієнтів без целіакії

Література: Oyaert M. Clin Chem Lab Med 2015; 53:1537-1546.

Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Пацієнт:

№ зам.:

Дата друку: 24.09.2026 17:30

с.2 з 2