

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 29.11.1982	Код замовлення: -
Стать: Чоловіча	Дата замовлення: 18.09.2026 18:34
Коментар:	

Секрет передміхурової залози. Аероби, факультативні анаероби з ідентифікацією MALDI-TOF MS. АБГ MIC

Дата видачі: 21.09.2026 09:06

Тип матеріалу: секрет передміхурової залози (бак. посів)

Мікроорганізм	Ступінь росту
Enterococcus faecalis	10*7 КУО/зразок
Маркери стійкості: HLGR - висока стійкість до гентаміцину Експертні правила: 854 Бактерії Enterococcus faecalis від природи стійкі до фузидієвої кислоти, цефалоспоринів, аміноглікозидів (низький рівень резистентності), хінупристину-дальфопристину, макролідів, кліндаміцину та сульфаніламідів 935 Ципрофлоксацин, левофлоксацин, нітрофурантоїн та триметоприм показані тільки при лікуванні неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів 969 Штами, чутливі до ванкоміцину, можуть вважатися чутливими до далбаванцину, оритаванцину та телаванцину 1511 Для ентерококових інфекцій з високим рівнем резистентності до гентаміцину (HLGR) неможливий синергізм з препаратом, діючим на клітинну стінку (ампіцилін, пеніцилін, ванкоміцин) 1704 Немає клінічних порогових рівнів чутливості до моксифлоксацину для видів Enterococcus, але моксифлоксацин використовується для пероральної ступінчастої терапії ендокартиту, спричиненого видами Enterococcus. Для виявлення механізмів резистентності до моксифлоксацину можна використовувати епідеміологічні пороги MIC (1 мг/л). В той же час якщо цей скринінг негативний, ізолят слід оцінювати як «дикий тип» або «без механізмів стійкості до фторхінолонів», але не як чутливий до моксифлоксацину 1822 Чутливість до ванкоміцину можна використовувати для прогнозування чутливості до оритаванцину 2012 Штами Enterococcus spp. стійкі до триметоприм та триметоприм-сульфаметоксазолу. Ці препарати клінічно неефективні 2014 Ізоляти ентерококу з високим рівнем резистентності до гентаміцину, також мають високий рівень резистентності до тобраміцину і амікацину	

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Enterococcus faecalis
Амікацин	R >16
Ампіцилін	S <=2
Ципрофлоксацин	R >4
Нітрофурантоїн	S <=32
Гентаміцин	R >4
Левофлоксацин	R >8
Триметоприм/сульфаметокс	R >8
Цефокситин	R >16
Кліндаміцин	R >1
Фузидієва кислота	R 4
Гентаміцин-Syn	R >500
Лінезолід	S <=2



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

    dila.ua

 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р.

Антибактеріальні препарати	Enterococcus faecalis
Стрептоміцин-Syn	S <=1000
Тейкопланін	S <=1
Ванкоміцин	S <=1