Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**
Дата народж.	16.07.1985	**Код замовлення:** -
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:** 21.09.2026 11:57
Коментар:		

Бакпосів із носа. Аероби, фак. анаероби MALDI-TOF MS. АБГ з MIC

Дата видачі: 24.09.2026 10:08

Тип матеріалу: мазок із носа

Мікроорганізм	Ступінь росту
Staphylococcus epidermidis	**10*4 КУО/зразок**

Маркери стійкості:
STAMLS - Фенотип MLSb Staphylococcus
Експертні правила:
814 Бактерицидна активність хінупристин-дальфопристину знижується у кліндаміцин-стійких стафілококів
823 Висновки про чутливість коагулазонегативних стафілококів (за виключенням S.lugdunensis і S. saprophyticus) до карбапенемів і відповідних цефалоспоринів робиться за результатами визначення чутливості до оксациліну (MIC <=0,25 мкг/мл). Такі штами являються в основному метицилін-чутливими у зв'язку з відсутністю генів mecA і mecC
832 Поєднання стійкості до пеніциліну та чутливості до оксациліну у стафілококів вказує на стійкість до пеніциліназа-лабільних пеніцилінів
947 Штами, чутливі до лінезоліду, можуть вважатися чутливими до тедизоліду
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії
1452 Ізоляти Staphylococcus spp. мають конститутивну MLSb резистентність
2203 Для видів Staphylococcus значення MIK левофлоксацина <=1 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Staphylococcus epidermidis
Амікацин	S <=8
Ципрофлоксацин	I <=1
Гентаміцин	S <=1
Левофлоксацин	I <=1
Триметоприм/сульфометокс	S <=2
Кліндаміцин	R >1
Даптоміцин	S <=1
Еритроміцин	R >4
Фузидієва кислота	R >8
Лінезолід	S <=2
Моксифлоксацин	S <=0.25
Пеніцилін	R >0.5
Тейкопланін	S <=2
Тетрациклін	R >2
Ванкоміцин	S <=1