Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	**Лаб. № замовлення**
Дата народж. 05.11.1998	**Код замовлення:** -
Стать: Жіноча	**Дата замовлення:** 24.09.2026 11:10
Коментар:	

Бакпосів з ротової порожнини, язика. Аероби, факультативні анаероби, MALDI-TOF MS. АБГ з МІС

Дата видачі: 27.09.2026 08:26

Тип матеріалу: мазок із ротової порожнини

Мікроорганізм	Ступінь росту
Streptococcus viridans	**10*6 КУО/зразок**

Виявлена резидентна мікрофлора ротової порожнини. Чутливість до антимікробних препаратів не визначається. Не виявлено ріст Str.pneumoniae, бета-гемолітичних стрептококів, зокрема Str.pyogenes (гр.А), Str.agalactiae (гр.В)

Enterobacter hormaechei — **10*3 КУО/зразок**

Експертні правила:
762 Цефотаксим, цефтріаксон та цефтазидим не можна використовувати в якості монотерапії, або в комбінації з аміноглікозидами, навіть якщо in vitro визначена чутливість до них, через селекцію резистентних мутантних штамів. Це може може призвести до клінічної неефективності протимікробної терапії
764 Комплекс Enterobacter cloacae від природи стійкий до ампіциліну, амоксициліну, амоксицилін-клавуланату, ампіцилін-сульбактаму, цефазоліну, цефалотину, цефалексину, цефадроксилу та цефокситину
974 Цефтібутен та цефазолін і темоцилін показані при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії

Serratia liquefaciens — **10*4 КУО/зразок**

Експертні правила:
965 Цефотаксим, цефтріаксон або цефтазидим не можна використовувати в якості монотерапії, навіть якщо in vitro визначена чутливість до них, через селекцію резистентних мутантних штамів. Це може призвести до клінічної неефективності протимікробної терапії
967 Тайгециклін володіє низькою активністю по відношенню до цього мікроорганізму, і мікроорганізм має бути визначений як стійкий, незалежно від результату тестування на чутливість
974 Цефтібутен та цефазолін і темоцилін показані при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Enterobacter hormaechei	Serratia liquefaciens
Амікацин	S <=8	S <=8
Амоксицилін/клавуланат	R >16	S 8
Ампіцилін	R 16	S <=4
Ампіцилін/сульбактам	R >8	S 4
Цефазолін	R <=4	
Цефепім	S <=1	S <=1
Цефтазідим	S <=1	S <=1
Цефтріаксон	S <=1	S <=1

Антибактеріальні препарати	Enterobacter hormaechei	Serratia liquefaciens
Ципрофлоксацин	S <=0.13	S <=0.13
Ертапенем	S <=0.25	S <=0.25
Гентаміцин	S <=2	S <=2
Іміпенем	S <=0.25	I 4
Левофлоксацин	S <=0.5	S <=0.5
Меропенем	S <=0.13	S 0.25
Піперацилін/тазобактам	S <=4	S <=4
Триметоприм/сульфометокс	S <=2	S <=2

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.