Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	14.08.1963	**Код замовлення:**	-
Стать:	Чоловіча	**Дата замовлення:**	19.08.2026 10:10
Коментар:			

Бак. посів стерильних рідин (амніотич. перитонеал. плеврал). Анаероби з антибіотикограмою ДДМ

Дата видачі: 22.08.2026 06:52

Тип матеріалу: стерильна рідина

Мікроорганізм	Ступінь росту
Staphylococcus epidermidis	

Експертні правила:
823 Висновки про чутливість коагулазонегативних стафілококів (за виключенням S.lugdunensis і S. saprophyticus) до карбапенемів і відповідних цефалоспоринів робиться за результатами визначення чутливості до оксациліну (MIC <=0,25 мкг/мл). Такі штами являються в основному метицилін-чутливими у зв'язку з відсутністю генів mecA і mecC
947 Штами, чутливі до лінезоліду, можуть вважатися чутливими до тедизоліду
968 Стафілококи, чутливі до еритроміцину та кліндаміцину, чутливі до всіх макролідів і лінкозамідів
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії
2203 Для видів Staphylococcus значення MIK левофлоксацина <=1 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"

Росту анаеробної мікрофлори не виявлено

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Staphylococcus epidermidis
Амікацин	S <=8
Ципрофлоксацин	I <=1
Гентаміцин	S <=1
Левофлоксацин	I <=1
Триметоприм/сульфометокс	S <=2
Кліндаміцин	S <=0.25
Даптоміцин	S <=1
Еритроміцин	S <=0.25
Фузидієва кислота	S <=1
Лінезолід	S <=2
Моксифлоксацин	S <=0.25
Тейкопланін	S <=2
Тетрациклін	S <=0.5
Ванкоміцин	S 2