

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Коментарі:

Пацієнт:

## TEST

Дата народження: 23.07.1995

Стать: Чоловіча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата взяття зразка: 15.10.2021 9:55

Назва дослідження	Результат	Одиниці виміру	Референтні значення	Коментарі
<b>Коронавірус (SARS-CoV-2), COVID-19, РНК RT-ПЛР-якісний, FTD (терміновий)</b> Первинна проба: мазок назоорофарингіальний				<b>Методика RT-ПЛР акредитована відповідно до стандарту ДСТУ ISO 15189</b>
<b>Визначення генів N та ORF1ab</b>	<b>УВАГА!</b> <b>* Виявлено РНК SARS-CoV-2</b>		не виявлено	
Відносне навантаження вірусної РНК у зразку	28.7	Цикли (Ct)	не виявлено	5-27 – високе вірусне навантаження 28-34 – середнє вірусне навантаження 35-40 – низьке вірусне навантаження > 40 – не виявлено Цикли (Ct) – кількість циклів ампліфікації ПЛР

## Заключення:

У зразку біологічного матеріалу, обстеженого методом RT-ПЛР-якісний/FTD (терміновий), встановлено наявність генетичного матеріалу вірусу SARS-CoV-2.

Підвищений ризик зараження оточуючих. З метою запобігання розповсюдження вірусу дотримуйтеся режиму самоізоляції. Рекомендовано звернутися до лікаря.

Дане дослідження призначено для виявлення генетичного матеріалу вірусу SARS-CoV-2. Для оцінки імунної відповіді рекомендовані дослідження на виявлення антитіл.

Інформаційна підтримка Контакт-центру ДІЛА: 0 800 217 887.



Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу



Покровська Т.О.





# Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Атестат про акредитацію відповідно до ДСТУ EN ISO 15189:2015 (EN ISO 15189: 2012, IDT) № 30001 від 04.09.2020 р.

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвісочного, 6  
www.dila.ua dila.ua

Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

## Що таке Ct та як інтерпретувати результати дослідження на COVID-19?

### Сучасна RT-ПЛР-діагностика COVID-19 у відділеннях лабораторії ДІЛА дозволяє:

- відповісти на питання – чи є вірус в зразку біологічного матеріалу?
- визначити вірусне навантаження – орієнтовну кількість вірусних часток в 1 мл досліджуваного матеріалу.

Вірусне навантаження вказує на заразність інфікованої людини для оточуючих та визначається за кількістю циклів ампліфікації (Ct). Ампліфікація – процес збільшення кількості копій вірусних фрагментів у зразку. З кожним циклом Ct кількість копій подвоюється. Чим більше вірусних частинок у зразку, тим швидше їх виявить тест-система ПЛР. Якщо вірусних частинок мало, для їх виявлення потрібна більша кількість циклів ампліфікації. Тобто, чим менше показник Ct, тим більше вірусне навантаження і, відповідно, заразність інфікованої людини для оточуючих. Якщо після 40-го циклу ампліфікації вірусний матеріал в зразку не виявляється, результат тесту вважається негативним. Клінічні прояви захворювання можуть бути відсутніми (безсимптомний перебіг) при будь-якому рівні вірусного навантаження

### ЩО ОЗНАЧАЄ ВАШ РЕЗУЛЬТАТ?

<b>Ct 5-27</b> <b>Високе ВН</b>	<p><b>Людина інфікована COVID-19, дуже високий ризик зараження оточуючих.</b>          Необхідно звернутися до лікаря, незалежно від наявності чи відсутності хвороби (симптоми можуть з'явитися пізніше), для оцінки стану в комплексі з оглядом і результатами інших досліджень. При наявності факторів ризику (вік, супутні захворювання) рекомендовано провести «Комплексне дослідження факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19» для прогнозу ризиків тяжкого перебігу.</p> <p><b>Рекомендовано</b> повторити RT-ПЛР-тест через 10-14 днів. Для визначення наявності імунної відповіді рекомендуємо здати тест на IgM або сумарні антитіла через 7-10 днів, IgG – через 2-3 тижні.</p>
<b>Ct 28-34</b> <b>Середнє ВН</b>	<p><b>Людина інфікована COVID-19, високий ризик зараження оточуючих.</b>          Рекомендовано звернутися до лікаря, незалежно від наявності чи відсутності хвороби (симптоми можуть з'явитися пізніше), для оцінки стану. З метою оцінки можливості тяжкого перебігу, особливо при наявності супутніх хвороб, рекомендується провести «Комплексне дослідження факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19».</p> <p><b>Рекомендовано</b> повторити RT-ПЛР-тест через 10-14 днів. Для визначення наявності імунної відповіді рекомендуємо здати тест на IgM або сумарні антитіла через 7-10 днів, IgG – через 2-3 тижні.</p>
<b>Ct 35-40</b> <b>Низьке ВН</b>	<p><b>Людина інфікована COVID-19, ризик зараження оточуючих зберігається та є ймовірно низьким.</b>          Може спостерігатися в період одужання або тоді, коли інфекція «копустилася» в нижні дихальні шляхи, та основна кількість вірусу знаходиться в клітинах легеневої тканини. При погіршенні стану (посилення лихоманки, задишки, кашлю) рекомендована консультація лікаря для оцінки стану.</p> <p>Також варто провести RT-ПЛР-тест мокроти або змивів з бронхів і тест «Комплексне дослідження факторів ризику тяжкого перебігу COVID-19».</p> <p>На початку захворювання (симптоми можуть з'явитися пізніше) необхідно звернутися до лікаря для спостереження за станом та повторити RT-ПЛР-тест через 10-14 днів. Для визначення наявності імунної відповіді рекомендуємо здати тест на IgM або сумарні антитіла через 7-10 днів, IgG – через 2-3 тижні. Також можливе транзиторне безсимптомне носійство.</p>
<b>РНК SARS-CoV-2 не виявлено</b>	<p><b>У зразку РНК вірусу SARS-CoV-2 не виявлено. Швидше за все людина здорована або вже одужала. Ризик зараження оточуючих відсутній. Якщо є симптоми, то ймовірно:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• людина інфікована іншим збудником ГРВІ;</li> <li>• вірус концентрується не в носоглотці, а в тканинах легенів або кишечника;</li> <li>• повторне взяття мазка через короткий проміжок часу (день в день або через добу), що зменшує кількість біоматеріалу в зразку і в свою чергу може призводити до негативних результатів</li> </ul> <p><b>Для уточнення діагнозу рекомендується:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• повторне взяття біологічного матеріалу на RT-ПЛР через 1-2 доби для чіткого визначення фази інфікування: початок чи кінець інфекції;</li> <li>• для визначення наявності імунної відповіді провести тест на IgM або сумарні антитіла через 7-10 днів, IgG – через 2-3 тижні;</li> <li>• провести тест для виключення інших інфекцій (Скрінінг респіраторних інфекцій, ПЛР, 21 показник, FTD (високочутливий);</li> <li>• при важкому стані потрібно провести RT-ПЛР-дослідження на визначення вірусу з іншого біологічного матеріалу (мокрота, змиви з бронхів, кал).</li> </ul>

Для пояснення результатів досліджень чи консультації щодо вибору дослідження ви можете звернутися за кваліфікованою допомогою в інформаційно-сервісну службу ДІЛА за телефоном: 0-800-219-696.

**Важливо!** Лікарі лабораторії ДІЛА не встановлюють діагноз та не призначають лікування, а лише можуть підтвердити або спростувати сумніви стосовно стану вашого здоров'я та порадити, до фахівця якого напрямку/спеціальності потрібно звернутися.

При виявленні будь-якого гену коронавірусу результат тесту є позитивним.

Більш детальна інформація на сайті: [dila.ua](http://dila.ua)

Шановний лікар!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно з вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат видає МОЗ М № 014792 від 27.03.2020

Шановний клієнт!

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом.  
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.