

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 27.02.1991	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 16.09.2026 13:32
Коментар:	

Бакпосів на стафілокок (Staphylococcus aureus) MALDI-TOF MS. АБГ з MIC

Дата видачі: 20.09.2026 09:24

Тип матеріалу: мазок із носа

Мікроорганізм	Ступінь росту
Staphylococcus aureus	5x10*5 КУО/зразок
Маркери стійкості: STAMLS - Фенотип MLSb Staphylococcus Експертні правила: 814 Бактерицидна активність хінупристин-дальфопристину знижується у кліндаміцин-стійких стафілококів 833 Висновки про чутливість штамів S. aureus і S. lugdunensis до карбапенемів і відповідних цефалоспоринов робиться за результатами визначення чутливості до цефокситину (MIC <=4 мкг/мл). Такі штами є в основному метицилін-чутливими у зв'язку з відсутністю генів mecA і mecC 947 Штами, чутливі до лінезоліду, можуть вважатися чутливими до тедизоліду 975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії 1427 Стафілокок, згідно отриманого значення MIC цефокситину, негативний по гену mecA 1452 Ізоляти Staphylococcus spp. мають конститутивну MLSb резистентність 1822 Чутливість до ванкоміцину можна використовувати для прогнозування чутливості до оритаванцину 2203 Для видів Staphylococcus значення MIK левофлоксацина <=1 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"	

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Staphylococcus aureus
Амікацин	S 8
Гентаміцин	S <=1
Левофлоксацин	I <=1
Триметоприм/сульфаметокс	S <=2
Кліндаміцин	R 0.5
Даптоміцин	S <=1
Еритроміцин	R >4
Фузидієва кислота	S <=1
Лінезолід	S <=2
Моксифлоксацин	S <=0.25
Пеніцилін	S <=0.13
Тейкопланін	S <=1
Тетрациклін	S <=0.5
Ванкоміцин	S <=1