

Шановний лікарю! Шановний клієнте! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 09.05.1995	Код замовлення: -
Стать: Чоловіча	Дата замовлення: 05.09.2026 8:44
Коментар:	

Бак. посів на стафілокок (Staphylococcus aureus) MALDI-TOF MS. АБГ з MIC, скринінг MRSA

Дата видачі: 08.09.2026 13:06

Тип матеріалу: мазок із носа

Мікроорганізм	Ступінь росту
Staphylococcus aureus	10*5 КУО/зразок
MRSA не виявлено	
Експертні правила:	
833 Висновки про чутливість штамів S. aureus і S. lugdunensis до карбапенемів і відповідних цефалоспоринов робиться за результатами визначення чутливості до цефокситину (MIC <=4 мкг/мл). Такі штами є в основному метицилін-чутливими у зв'язку з відсутністю генів mecA і mecC	
947 Штами, чутливі до лінезоліду, можуть вважатися чутливими до тедизоліду	
968 Стафілококи, чутливі до еритроміцину та кліндаміцину, чутливі до всіх макролідів і лінкозамідів	
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії	
1427 Стафілокок, згідно отриманого значення MIC цефокситину, негативний по гену mecA	
1822 Чутливість до ванкоміцину можна використовувати для прогнозування чутливості до оритаванцину	
2203 Для видів Staphylococcus значення MIK левофлоксацина <=1 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"	

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Staphylococcus aureus
Амікацин	S <=4
Гентаміцин	S <=1
Левофлоксацин	I <=1
Триметоприм/сульфаметокс	S <=2
Кліндаміцин	S <=0.25
Даптоміцин	S <=1
Еритроміцин	S <=0.25
Фузидієва кислота	S <=1
Лінезолід	S <=2
Моксифлоксацин	S <=0.25
Пеніцилін	S <=0.13
Тейкопланін	S <=1
Тетрациклін	S <=0.5
Ванкоміцин	S <=1