

## РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

<b>Пацієнт:</b>	<b>Лаб. № замовлення</b>
<b>Дата народж.</b> 28.02.1970	<b>Код замовлення:</b> -
<b>Стать:</b> Жіноча	<b>Дата замовлення:</b> 29.07.2025 10:59
<b>Коментар:</b>	

### Бак. посів сечі. Аероби з антибіотикограмою з MIC

Дата видачі: 01.08.2025 07:45

Тип матеріалу: сеча (Б/П)

<b>Мікроорганізм</b>	<b>Ступінь росту</b>
----------------------	----------------------

**Escherichia coli** **10\*6 КУО/мл**

Маркери стійкості:

ESBL - бета-лактамаза розширеного спектру

Експертні правила:

740 Якщо виявляється продукція ESBL, чутливість до оксिमінцефалоспоринов 3-го, 4-го поколінь та до азтреонаму, необхідно змінити категорію на "чутливий при збільшеній експозиції". Результат "чутливий при збільшеній експозиції" змінюється на категорію "резистентний"

974 Цефтібутен та цефазолін і темоцилін показані при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів

975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії

1403 При виявленні продукції ESBL, результати визначення чутливості до інгібіторозахищених бета-лактамів, цефаміцинів та оксацефемів необхідно змінити з категорії "чутливий" або "чутливий при збільшеній експозиції" на категорію "стійкий"

1505 Підтверджено, що ізолят продукує ESBL

**Чутливість до антимікробних препаратів:** S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стойкий

Антибактеріальні препарати	Escherichia coli
Амікацин	S <=8
Амоксицилін/клавуланат	R 4
Ампіцилін	R >16
Ампіцилін/сульбактам	R 2
Цефазолін	R >32
Цефепім	R 2
Цефтазідим	R 4
Цефтріаксон	R >4
Цефуроксим	R >16
Ципрофлоксацин	R >1
Ертапенем	S <=0.25
Гентаміцин	S <=2
Іміпенем	S 0.5
Левофлоксацин	R >2
Меропенем	S <=0.13
Піперацилін/тазобактам	R <=4
Триметоприм/сульфометокс	S <=2