BIO Predictive
http://www.biopredictive.com/

FibroTest

SN 3316573


П.І.Б.: TEST

Пацієнт
Дата народження 1958-04-08
Стать Ж
Вік 63 роки

Біомаркери		
Дата здачі аналізів	2021-03-22	
Альфа2 Макроглобулін	2,47	г/л
Гаптоглобін	0,63	г/л
Аполіпопротеїн А1	0,96	г/л
Білірубін	15	мкмоль/л
Гама ГТ	37	Од/л
АЛТ	69	Од/л


Результати тестів

FibroTest
FibroTest діагностує фіброз печінки



Результат: 0,69
(F3)

ActiTest
ActiTest діагностує активність некрозапального процесу у печінці (хронічний гепатит В і С)



Результат: 0,56
(A2)

Застереження по використанню та інтерпретації тестів

Дотримання рекомендованих компанією BioPredictive умов до і під час проведення аналізів є основою отримання достовірних результатів. Тести не застосовуються при гострому гемолізі, гострому гепатиті, гострих запальних захворюваннях, позапечінковому холестазі. Порадьтеся з фахівцем при інтерпретації тесту в разі хронічного гемолізу або синдрому Жильбера. Інтерпретація тестів не була апробована на пацієнтах з трансплантованою печінкою. Будьте уважні при інтерпретації результатів в разі виходу за нормальні значення будь-якого з показників. У разі невідповідності між результатом біопсії і тестом рекомендується проконсультуватися з лікарем фахівцем. Причини цих невідповідностей можуть бути пов'язані з дефектом тесту або дефектом біопсії: тобто біопсія печінки має частоту варіабельності 35% для однієї стадії фіброзу. Рівень АЛТ може бути заниженим в осіб з дефіцитом вітаміну В6 (це не впливає на оцінку FibroTest, але може занижувати оцінювання при ActiTest).
FibroTest проводиться при хронічних гепатитах В і С, алкогольному і неалкогольному стеатозі. ActiTest проводиться при хронічних гепатитах В і С.


Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020
Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Як інтерпретувати результати тесту?

У даному керівництві по інтерпретації представлені тести компанії BioPredictive з діагностики основних захворювань печінки.
Використані в керівництві значення є умовними і носять пояснювальний характер.
Результат, отриманий при підрахунку Вашого тесту, представлений на окремій сторінці.

Назва тесту

FibroTest



шкала (оцінка): 0.31


(F1)

Результат

Інтерпретація тесту

FibroTest

діагностує фіброз печінки




FibroTest оцінює наявність фіброзу (рубця) у печінці
- F0: відсутність фіброзу
- F1: мінімальний фіброз
- F2: помірний фіброз
- F3: прогресуючий фіброз
- F4: важкий фіброз (цироз)

Фіброз: ураження, спричинене реакцією печінки на атаку вірусу гепатиту, жир або алкоголь. Фіброз печінки зазвичай порівнюють із рубцем, який поширюється в печінці

SteatoTest

оцінює жирове перевантаження (стеатоз або жирова печінка)




SteatoTest оцінює стеатоз печінки:
- S0: стеатоз відсутній (<1%)
- S1: мінімальний стеатоз (1-5%)
- S2: значний стеатоз (6-32%)
- S3: важкий стеатоз (> 32%)

Стеатоз: накопичення жиру в печінці, викликане метаболічними порушеннями (підвищеному холестерині, тригліцеридах, цукровому діабеті, зайвій вазі). Стеатоз зазвичай називають жировою печінкою.

ActiTest

оцінює активність (запалення при хронічному вірусному гепатиті С або В)




ActiTest діагностує ступінь активності запалення:
- A0: активність відсутня
- A1: мінімальна активність
- A2: помірна активність
- A3: висока активність

Активність процесу - запальні зміни у печінці, що спостерігаються при хронічних гепатитах В і С.

NashTest

оцінює НАСГ - неалкогольний стеатогепатит (запальний процес при порушенні обміну речовин: при діабеті, надмірній вазі, підвищеному рівні холестерину чи тригліцеридів)




NashTest оцінює НАСГ:
- N0: відсутній НАСГ
- N1: можливий НАСГ
- N2: НАСГ присутній

НАСГ: запалення печінки, яке пов'язане зі стеатозом («жировою печінкою»). НАСГ - це надмірна реакція організму на накопичення жиру в печінці. Запалення часто порівнюють із опіком.

AshTest

оцінює запалення печінки (при надмірному вживанні алкоголю)



AshTest це тест, який оцінює запалення викликане вживанням алкоголю:
- H0: відсутність запалення
- H1: помірне запалення
- H2: значне запалення
- H3: важке запалення

Активність: запалення печінки, спричинене алкоголем. Активність часто порівнюють із опіком.

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001 Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗУ МЗ № 014792 від 27.03.2020

CE IVD BioPredictive, 218 Bd Saint Germain, 75007 PARIS, France

NASH-FibroTest™ включає в себе всі перераховані вище тести.

biopredictive.com

BioPredictive S.A.
218 Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS - FRANCE
Tel : +33 1 84 79 23 90
contact@biopredictive.com

BIO Predictive

Щоб дізнатися більше, проконсультуйтеся зі своїм лікуючим лікарем.