

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а
🌐 📱 📺 📞 dila.ua

📞 Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 18.03.2022	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 08.02.2026 11:33
Коментарі:	

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Антитіла до тканинної трансглутамінази IgA Первинна проба: венозна кров Метод ELIA	0.4 негативний	Од/мл	< 7 7-10 >10	негативний сумнівний позитивний

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії клінічної імунології та алергології Пшенична І.В.

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Що таке співвідношення імовірності (CI)?

CI, пов'язаний з відсутністю або наявністю захворювання			
CI-	Виключення захворювання	< 0.1	Високий зв'язок із відсутністю захворювання
	Співвідношення імовірності нижче 1,0 (CI-) свідчить про те, наскільки зменшується ймовірність захворювання, якщо тест негативний. Чим нижче CI-, тим більша ймовірність відсутності захворювання.	0.1 – 0.2	Помірний зв'язок із відсутністю захворювання
		0.2 – 0.5	Слабкий зв'язок із відсутністю захворювання
		0.5 – 2	Відсутність зв'язку з хворобою
CI+	Підтвердження захворювання	2 – 5	Слабкий зв'язок із наявністю захворювання
	Співвідношення ймовірності вище 1 (CI+) свідчить про те, наскільки збільшується ймовірність захворювання, якщо тест позитивний. Чим вище CI+, тим більша ймовірність захворювання.	5 – 10	Помірний зв'язок із наявністю захворювання
		> 10	Високий зв'язок із наявністю захворювання

Целіакія

Антитіла до тканинної трансглютамінази IgA ELIA (для дітей)	Інтервал результатів	CI	Зв'язок з целіакією у дітей
	< 7 U/ml	0.11	У 9 разів частіше зустрічається у пацієнтів без целіакії, ніж у пацієнтів з целіакією
	7 – 70 U/ml	48.20	У 48,2 разів більша ймовірність виявлення у пацієнтів із целіакією, ніж у пацієнтів без целіакії
	> 70 U/ml	> 81	Усі діти з результатом тесту ELIA Celikey IgA > 70 U/ml мали целіакію

Література: Bogaert L et al. Autoimmunity Reviews 2020; 19: 102513.