Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	**Лаб. № замовлення**
Дата народж. 26.01.1991	**Код замовлення:** -
Стать: Чоловіча	**Дата замовлення:** 08.09.2026 12:25
Коментар:	

Баланопостит. Аероби, факультативні анаероби з ідентифікацією MALDI-TOF MS. Антибіотикограма з MIC

Дата видачі: 10.09.2026 13:59

Тип матеріалу: мазок з головки статевого члена

Мікроорганізм	Ступінь росту
Enterococcus faecalis	**10*6 КУО/зразок**

Маркери стійкості:
HLGR - висока стійкість до гентаміцину
Експертні правила:
854 Бактерії Enterococcus faecalis від природи стійкі до фузидієвої кислоти, цефалоспоринів, аміноглікозидів(низький рівень резистентності), хінупристину-дальфопристину, макролідів, кліндаміцину та сульфаніламідів
935 Ципрофлоксацин, левофлоксацин, нітрофурантоїн та триметоприм показані тільки при лікуванні неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів
969 Штами, чутливі до ванкоміцину, можуть вважатися чутливими до далбаванцину, оритаванцину та телаванцину
1511 Для ентерококових інфекцій з високим рівнем резистентності до гентаміцину (HLGR) неможливий синергізм з препаратом, діючим на клітинну стінку (ампіцилін, пеніцилін, ванкоміцин)
1704 Немає клінічних пороогових рівнів чутливості до моксифлоксацину для видів Enterococcus, але моксифлоксацин використовується для пероральної ступінчастої терапії ендокардиту, спричиненого видами Enterococcus.Для виявлення механізмів резистентності до моксифлоксацину можна використовувати епідеміологічні порогові MIC (1 мг/л) . В той же час якщо цей скринінг негативний, ізолят слід оцінювати як «дикий тип» або «без механізмів стійкості до фторхінолонів», але не як чутливий до моксифлоксацину
1822 Чутливість до ванкоміцину можна використовувати для прогнозування чутливості до оритаванцину
2012 Штами Enterococcus spp. стійкі до триметоприм та триметоприм-сульфаметоксазолу. Ці препарати клінічно неефективні
2014 Ізоляти ентерококу з високим рівнем резистентності до гентаміцину, також мають високий рівень резистентності до тобраміцину і амікацину

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Enterococcus faecalis
Амікацин	R >16
Ампіцилін	S <=2
Ципрофлоксацин	S <=1
Нітрофурантоїн	S <=32
Гентаміцин	R >4
Левофлоксацин	S <=1
Триметоприм/сульфометокс	R <=2
Цефокситин	R >16
Кліндаміцин	R >1
Фузидієва кислота	R 4
Гентаміцин-Syn	R >500
Стрептоміцин-Syn	S <=1000

Антибактеріальні препарати	Enterococcus faecalis
Тейкопланін	S <=1
Ванкоміцин	S <=1

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001