Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	**Лаб. № замовлення**
Дата народж. 25.04.1990	**Код замовлення:** -
Стать: Жіноча	**Дата замовлення:** 26.09.2026 10:13
Коментар:	

Бакпосів із мигдалин. Аероби, фак. анаероби MALDI-TOF MS. АБГ з MIC

Дата видачі: 29.09.2026 11:11

Тип матеріалу: мазок із задньої стінки глотки

Мікроорганізм	Ступінь росту
Streptococcus viridans	**10*6 КУО/зразок**

Виявлена резидентна мікрофлора ротової порожнини. Чутливість до антимікробних препаратів не визначається. Не виявлено ріст Str.pneumoniae, бета-гемолітичних стрептококів, зокрема Str.pyogenes (гр.А), Str.agalactiae (гр.В)

Serratia marcescens **10*3 КУО/зразок**

Маркери стійкості:
CBPEN - штам стійкий до одного чи декількох карбапенемів
Експертні правила:
781 Штами Serratia marcescens від природи стійкі до ампіциліну, амоксициліну, амоксицилін-клавуланату, ампіцилін-сульбактаму, цефазоліну, цефалотину, цефалексину, цефадроксилу, цефокситину, цефуроксиму, тетрацикліну, доксицикліну, поліміксину В, колістину та нітрофурантоїну
967 Тайгециклін володіє низькою активністю по відношенню до цього мікроорганізму, і мікроорганізм має бути визначений як стійкий, незалежно від результату тестування на чутливість
974 Цефтібутен та цефазолін і темоцилін показані при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії
1433 Даний ізолят резистентний до одного або більше цефалоспоринів 3-го, 4-го поколінь. Що свідчить про можливу продукцію ESBL, гіперпродукцію AmpC та/або інших бета-лактамаз розширеного спектру
1463 По результатам проведених тестів ізолят резистентний до карбапенемів

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Serratia marcescens
Амікацин	S <=8
Амоксицилін/клавуланат	R >16
Ампіцилін	R >16
Ампіцилін/сульбактам	R >8
Цефазолін	R >32
Цефепім	R >8
Цефтазідим	R >8
Цефтріаксон	R 4
Цефуроксим	R >16

Антибактеріальні препарати	Serratia marcescens
Ципрофлоксацин	S <=0.13
Ертапенем	S <=0.25
Гентаміцин	S <=2
Іміпенем	R 8
Левофлоксацин	S <=0.5
Меропенем	S 2
Піперацилін/тазобактам	S <=4
Триметоприм/сульфометокс	S <=2

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001