Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**
Дата народж.	31.07.1955	**Код замовлення:** -
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:** 17.09.2026 10:56
Коментар:		

Бакпосів із рани, абсцесів. Аероби, фак. анаероби MALDI-TOF MS. АБГ з MIC

Дата видачі: 20.09.2026 13:06

Тип матеріалу: екссудат рани

Мікроорганізм	Ступінь росту
Staphylococcus aureus	**10*6 КУО/зразок**

Експертні правила:
814 Бактерицидна активність хінупристин-дальфопристину знижується у кліндаміцин-стійких стафілококів
833 Висновки про чутливість штамів S. aureus і S. lugdunensis до карбапенемів і відповідних цефалоспоринів робиться за результатами визначення чутливості до цефокситину (MIC <=4 мкг/мл). Такі штами є в основному метицилін-чутливими у зв'язку з відсутністю генів mecA і mecC
947 Штами, чутливі до лінезоліду, можуть вважатися чутливими до тедизоліду
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії
1427 Стафілокок, згідно отриманого значення MIC цефокситину, негативний по гену mecA
1822 Чутливість до ванкоміцину можна використовувати для прогнозування чутливості до оритаванцину
2203 Для видів Staphylococcus значення MIK левофлоксацина <=1 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Staphylococcus aureus
Амікацин	S 8
Гентаміцин	S <=1
Левофлоксацин	I <=1
Триметоприм/сульфометокс	S <=2
Кліндаміцин	R 0.5
Даптоміцин	S <=1
Еритроміцин	S 1
Фузидієва кислота	S <=1
Лінезолід	S <=2
Моксифлоксацин	S <=0.25
Пеніцилін	S <=0.13
Тейкопланін	S <=1
Тетрациклін	S <=0.5
Ванкоміцин	S <=1