

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 28.08.1976

Стать: Чоловіча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата замовлення: 23.08.2022 16:54

ВЛН: 123456789064

Зразок: вміст абсцесу

Мікробіологічне дослідження

Абсцеси будь-якої локалізації. Визначення аеробів з АБЧ з MIC мг/л

Результат 1

Staphylococcus epidermidis

10*5 КУО/зразок

Маркери резистентності:

MRS - Staphylococcus, стійкі до метициліну

BLACT - Staphylococcus, продукуючий бета-лактамазу

Експертні правила:

824-Коагулазонегативні стафілококи (за виключенням S.lugdunensis та S.saprophyticus) з показником MIC оксациліну

>0,25 мг/л є у більшості випадків метицилін-резистентними через наявність гену mecA або mecC

1510-MRS стійкі до пеніцилінів, інгібіторозахищених бета-лактамів, цефалоспоринов (окрім цефалоспоринов з

активністю щодо MRS), карбапенемів. Вищевказані препарати клінічно неефективні.

1506-Підтверджено, що культура позитивна по бета-лактамазі (на основі нітроцефіну)

947-Штами, чутливі до лінезоліду, можуть вважатися чутливими до тедизоліду.

975-Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозидів або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії

Коментарі:

Пацієнт:

TEST

Дата народження: 28.08.1976

Стать: Чоловіча

Код замовлення:

Лабораторний номер: 123456789

Дата замовлення: 23.08.2022 16:54

Чутливість до антимікробних препаратів

S=Чутливий I=Помірно стійкий R=Стійкий

ВЛН: 123456789064

Результат 1

Амікацин S <=8

Амоксицилін/клавула R <=2

Ципрофлоксацин R >4

Гентаміцин S <=1

Левовфлоксацин R 8

Триметоприм/сульфо S <=2

Цефокситин R 8

Кліндаміцин S <=0.25

Даптоміцин S <=1

Еритроміцин R >4

Фосфоміцин S <=8

Фузидієва кислота S <=1

Лінезолід S <=2

Моксифлоксацин R 0.5

Оксацилін R 4

Пеніцилін R >0.5

Тейкопланін S <=2

Тетрациклін R >2

Ванкоміцин S 2