Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	**Лаб. № замовлення**
Дата народж. 22.07.1969	**Код замовлення:** -
Стать: Чоловіча	**Дата замовлення:** 01.07.2025 12:13
Коментар:	

Кров на стерильність. Аероби з антибіотикограмою з MIC

Дата видачі: 04.07.2025 08:57

Тип матеріалу: цільна ВК/ЕДТА

Мікроорганізм	Ступінь росту

Staphylococcus aureus

Маркери стійкості:
BLACT - Staphylococcus, продукуючий бета-лактамазу
Експертні правила:
821 Штами, продукуючі пеніциліназу, стійкі до бензилпеніциліну, феноксиметилпеніциліну, аміно-, карбокси- і уреідопеніцилінам
833 Висновки про чутливість штамів S. aureus і S. lugdunensis до карбапенемів і відповідних цефалоспоринів робиться за результатами визначення чутливості до цефокситину (MIC <=4 мкг/мл). Такі штами є в основному метицилін-чутливими у зв'язку з відсутністю генів mecA і mecC
946 Штами чутливі до ванкоміцину, можуть вважатися чутливими до далбаванцину і оритаванцину
947 Штами, чутливі до лінезоліду, можуть вважатися чутливими до тедизоліду
968 Стафілококи, чутливі до еритроміцину та кліндаміцину, чутливі до всіх макролідів і лінкозамідів
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії
1427 Стафілокок, згідно отриманого значення MIC цефокситину, негативний по гену mecA
1506 Підтверджено, що культура позитивна по бета-лактамазі (на основі нітроцефіну)
2203 Для видів Staphylococcus значення MIK левофлоксацина <=1 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Staphylococcus aureus
Амікацин	S 8
Ампіцилін	R >1
Ципрофлоксацин	I <=1
Гентаміцин	S <=1
Левофлоксацин	I <=1
Триметоприм/сульфометокс	S <=2
Кліндаміцин	S <=0.25
Даптоміцин	S <=1
Еритроміцин	S <=0.25
Фузидієва кислота	S <=1
Лінезолід	S <=2
Моксифлоксацин	S <=0.25
Оксацилін	S 0.5
Пеніцилін	R >0.5

Антибактеріальні препарати	Staphylococcus aureus
Тейкопланін	S <=1
Тетрациклін	S <=0.5
Ванкоміцин	S <=1

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2