

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 07.01.1994	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 23.09.2026 9:46
Коментар:	

Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae. MALDI-TOF MS. Антибіотикограма з MIC

Дата видачі: 28.09.2026 09:13

Тип матеріалу: зішкріб із вагіни і ректума

Мікроорганізм	Ступінь росту
---------------	---------------

Streptococcus agalactiae

Експертні правила:

852 Синергізм між аміноглікозидами і діючими на клітинну стінку антибіотиками (пеніцилінами і глікопептидами) володіє бактерицидною дією по відношенню до штамів, які не проявляють високого рівня резистентності до аміноглікозидів і чутливих антибіотиків, які діють на клітинну стінку

869 При виявленні чутливості до пеніциліну також спостерігається чутливість до амінопеніцилінів, цефалоспоринов і карбапенемів

946 Штами чутливі до ванкоміцину, можуть вважатися чутливими до далбаванцину і оритаванцину

947 Штами, чутливі до лінезоліду, можуть вважатися чутливими до тедизоліду

977 Streptococcus pneumoniae та бета-гемолітичні стрептококи не продукують бета-лактамаз. Застосування інгібіторів бета-лактамази є недоцільним

991 Для Streptococcus pneumoniae та бета-гемолітичних стрептококів при MIC левофлоксацина ≤ 2 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Streptococcus agalactiae
Цефепім	S ≤ 0.5
Цефуросим	S ≤ 0.25
Левовфлоксацин	I ≤ 0.5
Меропенем	S ≤ 0.13
Кліндаміцин	S 0.06
Даптоміцин	S ≤ 0.25
Еритроміцин	S ≤ 0.06
Гентаміцин-Syn	S ≤ 250
Лінезолід	S 1
Моксифлоксацин	S ≤ 0.25
Пеніцилін	S 0.06
Тейкопланін	S ≤ 1
Тетрациклін	S ≤ 0.5
Ванкоміцин	S ≤ 0.5
Амоксицилін	S ≤ 0.25
Цефотаксим	S ≤ 0.5