Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

# РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Пацієнт:** | | **Лаб. № замовлення** | |
| **Дата народж.** | 07.09.1998 | **Код замовлення:** | - |
| **Стать:** | Жіноча | **Дата замовлення:** | 05.09.2025 8:07 |
| ***Коментарі:*** | | | |

| Назва дослідження | Результат | Одиниці вимірювання | Референтні значення | Коментарі |
|---|---|---|---|---|
| **Комплекс №427 "Обстеження жінки"** | | | | |
| Андростендіон<br>Первинна проба: венозна кров | 2.3 | нг/мл | 0,4 - 4,1 | |
| Калій<br>Первинна проба: венозна кров | 4.09 | ммоль/л | 3,5 - 5,5 | |
| Натрій<br>Первинна проба: венозна кров | 143 | ммоль/л | 132 - 146 | |
| Залізо<br>Первинна проба: венозна кров | 12.7 | мкмоль/л | 9,0 - 30,4 | |
| Магній<br>Первинна проба: венозна кров | 0.88 | ммоль/л | 0,66 - 1,07 | |
| Загальний холестерин (ЗХ, Total cholesterol , ТС)<br>Первинна проба: венозна кров | 4.50 | ммоль/л | < 5,2 | Референтні значення, ESC 2016:<br>< 5.2 для загальної популяції;<br>< 4.5 для пацієнтів з ІХС, цукровим діабетом. |
| Білірубін загальний (tBIL)<br>Первинна проба: венозна кров | 9.5 | мкмоль/л | 5,0 - 21,0 | |
| Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT)<br>Первинна проба: венозна кров | 11 | Од/л | 4 - 31 | |
| Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST)<br>Первинна проба: венозна кров | 14 | Од/л | 4 - 31 | |
| Креатинін<br>Первинна проба: венозна кров | 71 | мкмоль/л | 49 - 90 | |
| Гомоцистеїн<br>Первинна проба: венозна кров | **11.9*** | мкмоль/л | 3,7 - 11,0 | 11-14 помірний ризик ССЗ<br>15-29 високий ризик ССЗ<br>>29 дуже високий ризик ССЗ<br>Вагітні:<br>I триместр <5.6<br>II триместр <4.3<br>III триместр <3.3 |

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Феритин<br>Первинна проба: венозна кров | 19.40 | нг/мл | 11,0 - 306,8 | Референтні значення:<br>0-15 д. 39.84 - 539.85<br>15 д.-6 м. 15.25 - 374.58<br>6 м.-1 рік 13.32 - 191.89<br>1-16 років 10.29 - 55.84<br>16-19 років 3.20 - 75.11<br>Від 19 років 11.0-306.8 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін, vitamin B12, cyanocobalamin), біотин-незалежний, кількісний<br>Первинна проба: венозна кров | 295.0 | пг/мл | 180,0 - 914,0 | |
| 25-гідроксивітамін Д<br>Первинна проба: венозна кров | **40.1*** | нмоль/л | 75 - 125 | <50 - дефіцит вітаміну D;<br>>=50 - <75 - недостатність вітаміну D;<br>75-125 - достатній рівень вітаміну D;<br>>125-150 - безпечний, але не цільовий рівень вітаміну D;<br>>150-250 - зона невизначеності з потенційними перевагами чи ризиками;<br>>250 - надлишок/зона токсичності вітаміну D.<br>Діагностика, профілактика та лікування дефіциту вітаміну D у дорослих: Консенсус українських експертів, 2023р |
| Цільовий рівень вітаміну D залежить від особливостей стану здоров'я пацієнта. Зверніться до лікаря | | | | |
| Тиреотропний гормон (ТТГ). Високочутлива, біотин-незалежна методика<br>Первинна проба: венозна кров | **5.330*** | мкОд/мл | 0,4 - 4,85 | Для вагітних (всі триместри):<br>0.2 - 3.5 |
| Тироксин вільний (Т4 вільний)<br>Первинна проба: венозна кров | 0.82 | нг/дл | 0,61 - 1,47 | Референтні значення для вагітних:<br>I триместр- 0,65-1,05<br>II триместр - 0,55-0,96<br>III триместр - 0,52-0,93 |
| Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)<br>Первинна проба: венозна кров | <0.25<br>негативний | МО/мл | < 9 | < 9.0 негативний<br>>=9.0 позитивний |
| Фолікулостимулюючий гормон<br>Первинна проба: венозна кров | 14.02 | Од/л | - | Референтні значення для жінок:<br>0-1 рік 0.20-15.73<br>1-9 років 0.62-6.37<br>9-12 років 0.91-7.83<br>12-19 років 0.59-10.19<br>Від 19 років:<br>Середина Фолікулінової фази 3.85-8.78<br>Овуляторний пік 4.54-22.51<br>Середина лютеїнової фази 1.79-5.12<br>Постменопауза 16.74-113.59 |

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Естрадіол<br>Первинна проба: венозна кров | 35.70 | пг/мл | - | Референтні значення для жінок:<br>0-1 рік <38.2<br>1-12 років <16.0<br>12-19 років <196.0<br>Від 19 років:<br>Рання фолікулінова фаза 22.4 -115.0<br>Середина фолікулінової фази 25.0-115.0<br>Овуляторний пік 32.1-517.0<br>Середина лютеїнової фази 36.5-246.0<br>Постменопауза <25.1 |
| Лютеїнізуючий гормон<br>Первинна проба: венозна кров | 6.63 | Од/л | - | Референтні значення для жінок:<br>0-1 рік <3.28<br>1-5 років <2.14<br>5-10 років <1.67<br>10-14 років <8.09<br>14-19 років 1.59-18.99<br>Від 19 років:<br>Середина фолікулярної фази 2.12-10.89<br>Овуляторний пік 19.18-103.03<br>Середина лютеїнової фази 1.20-12.86<br>Постменопауза 10.87-58.64 |
| Пролактин<br>Первинна проба: венозна кров | 60.91 | нг/мл | - | Референтні значення для жінок:<br>0-30 д. >50.87<br>30 д.-1 рік 3.97-70.99<br>1-19 років 3.21-18.46<br>Репродуктивний період (пременопауза) (<50 років) 3.34-26.72<br>Постменопауза (>50 років) 2.74-19.64 |
| Тестостерон загальний<br>Первинна проба: венозна кров | 0.62 | нмоль/л | - | Референтні значення для жінок:<br>Репродуктивний період: 0.42 - 2.06<br>Постменопауза: <1.7 |
| Тестостерон вільний<br>Первинна проба: венозна кров | 1.64 | пг/мл | 0,1 - 5,45 | |
| Увага! Змінено референтні значення.<br>Змінено тест-систему для проведення дослідження.<br>Для моніторингу лікування рекомендовано відстежувати динаміку показника з 29.08.2025р. | | | | |
| Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)<br>Первинна проба: венозна кров | 90.9 | мкг/дл | 65 - 380 | |
| Дигідротестостерон<br>Первинна проба: венозна кров | 36.9 | пг/мл | < 399 | |

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17-оксипрогестерон<br>Первинна проба: венозна кров | 0.93 | нг/мл | - | фолікулінова фаза 0,1-0,8<br>лютеїнова фаза 0,6-2,3<br>овуляторний пік 0,3-1,4<br>менопауза 0,13-0,51<br>вагітні 2,0-12,0<br>після АКТГ <3,2 |
| Кальцій іонізований<br>Первинна проба: венозна кров | 1.13 | ммоль/л | 1.09 - 1.35 | |
| Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) x Інсулін/22,5)<br>Первинна проба: венозна кров | **2.8*** | | < 2.5 | |
| Глюкоза (кількісний)<br>Первинна проба: венозна кров | 4.9 | ммоль/л | 4,0 - 5,5 | натщесерце<br>5.6-6.9 ммоль/л-Предіабет<br>>=7.0 ммоль/л-Діабет<br>Наказ МОЗ України від 24.07.2024 р. № 1300 Уніфікований клінічний протокол первинної та спеціалізованої медичної допомоги "Цукровий діабет 2 типу у дорослих" |
| Цільовий рівень глюкози у плазмі венозної крові натще пацієнтам з раніше діагностованим цукровим діабетом та вагітним встановлює лікар. | | | | |
| Інсулін<br>Первинна проба: венозна кров | 13.0 | мОд/л | 1,9 - 23,0 | |

**Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор)**

**Первинна проба: венозна кров**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Лейкоцити (WBC) | 7.50 | Г/л | 3,9 - 10,2 |
| Еритроцити (RBC) | 4.67 | Т/л | 3,9 - 5,2 |
| Гемоглобін (Hgb) | 138 | г/л | 120 - 156 |
| Гематокрит (Ht) | 38.8 | % | 35,5 - 45,5 |
| Тромбоцити (PLT) | 243 | Г/л | 166 - 389 |
| Тромбокрит (PCT) | 0.210 | % | 0.15 - 0.31 |
| Середній об`єм еритроцитів (MCV) | 83.1 | fL | 80,0 - 99,0 |
| Середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті (MCH) | 29.5 | пг | 27 - 33,5 |
| Середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах (MCHC) | 355 | г/л | 315 - 360 |
| Ширина розподілення еритроцитів по об`єму (коефіцієнт варіації) (RDW-CV) | 13.5 | % | 11,5 - 14,7 |
| Ширина розподілення еритроцитів по об'єму, (стандартне відхилення) (RDW-SD) | 39.4 | fL | 37.6 - 50.3 |
| Низька щільність гемоглобіну (LHD) | **0.7*** | % | 1.2 - 16.9 |
| Фактор мікроцитарної анемії (MaF) | 11.4 | % | 8.5 - 15.2 |

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ядровмісні еритроцити (NRBC) | 0.2 | % | 0.0 - 0.3 |
| Ядровмісні еритроцити (NRBC) | 0.01 | Г/л | 0.0 - 0.02 |
| Середній об`єм тромбоцитів (MPV) | 8.7 | fL | 5.9 - 9.90 |
| Ширина розподілення тромбоцитів по об`єму (PDW) | 16.9 | % | 15,7 - 18 |
| Незрілі гранулоцити (IG) | 0.2 | % | 0.0 - 1.1 |
| Незрілі гранулоцити (IG) | 0.02 | Г/л | 0.0 - 0.08 |
| Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення (NLR) | **1.15*** | | 1.69 - 3.35 |
| Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu) | 49.16 | % | 40 - 70 |
| Загальні нейтрофіли (сегментоядерні та паличкоядерні) (Neu) | 3.68 | Г/л | 1,7 - 7,2 |
| Лімфоцити (LY) | 42.92 | % | 20 - 44 |
| Лімфоцити (LY) | 3.21 | Г/л | 1,1 - 4,5 |
| Моноцити (Mon) | 6.11 | % | 2 - 9,5 |
| Моноцити (Mon) | 0.46 | Г/л | 0,1 - 0,9 |
| Еозинофіли (Eo) | 1.26 | % | 0,5 - 5,5 |
| Еозинофіли (Eo) | 0.09 | Г/л | 0.02 - 0.5 |
| Базофіли (Bas) | 0.55 | % | 0 - 1.75 |
| Базофіли (Bas) | 0.04 | Г/л | 0 - 0.2 |
| Швидкість осідання еритроцитів (ESR) | **24*** | мм/год | < 15 |
| Загальний білок<br>Первинна проба: венозна кров | 76 | г/л | 57 - 82 |

**Відповідальна особа**
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*