Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	**Лаб. № замовлення**
Дата народж. 28.03.1954	**Код замовлення:** -
Стать: Жіноча	**Дата замовлення:** 01.07.2025 11:08
Коментар:	

Бак. посів на стафілокок (Staphylococcus aureus) з антибіотикограмою з MIC

Дата видачі: 03.07.2025 07:44

Тип матеріалу: мазок із носа

Мікроорганізм	Ступінь росту
Staphylococcus aureus	**10*5 КУО/зразок**

Експертні правила:
814 Бактерицидна активність хінупристин-дальфопристину знижується у кліндаміцин-стійких стафілококів
833 Висновки про чутливість штамів S. aureus і S. lugdunensis до карбапенемів і відповідних цефалоспоринів робиться за результатами визначення чутливості до цефокситину (MIC <=4 мкг/мл). Такі штами є в основному метицилін-чутливими у зв'язку з відсутністю генів mecA і mecC
946 Штами чутливі до ванкоміцину, можуть вважатися чутливими до далбаванцину і оритаванцину
947 Штами, чутливі до лінезоліду, можуть вважатися чутливими до тедизоліду
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії
1426 Нітроцефіновий тест для виявлення продукції бета-лактамази - негативний
1427 Стафілокок, згідно отриманого значення MIC цефокситину, негативний по гену mecA
2203 Для видів Staphylococcus значення MIK левофлоксацина <=1 мкг/мл слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Staphylococcus aureus
Амікацин	S 8
Ципрофлоксацин	I <=1
Гентаміцин	S <=1
Левофлоксацин	I <=1
Триметоприм/сульфометокс	S <=2
Кліндаміцин	R 0.5
Даптоміцин	S <=1
Еритроміцин	S <=0.25
Фузидієва кислота	S <=1
Лінезолід	S <=2
Моксифлоксацин	S <=0.25
Оксацилін	S 0.5
Тейкопланін	S <=1
Тетрациклін	S <=0.5
Ванкоміцин	S <=1