Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	25.09.1989	**Код замовлення:**	-
Стать:	Чоловіча	**Дата замовлення:**	28.06.2025 9:55
Коментар:			

Бак. посів на ентеробактерії, неферментуючі грамнегатив. бактерії з маркерами резистент. з АБГ MIC

Дата видачі: 02.07.2025 18:31

Тип матеріалу: мазок із язика

Мікроорганізм	Ступінь росту
Serratia liquefaciens	**10*5 КУО/зразок**

Маркери стійкості:
CBPEN - штам стійкий до одного чи декількох карбапенемів
Експертні правила:
965 Цефотаксим, цефтріаксон або цефтазидим не можна використовувати в якості монотерапії, навіть якщо in vitro визначена чутливість до них, через селекцію резистентних мутантних штамів. Це може призвести до клінічної неефективності протимікробної терапії
967 Тайгециклін володіє низькою активністю по відношенню до цього мікроорганізму, і мікроорганізм має бути визначений як стійкий, незалежно від результату тестування на чутливість
974 Цефтібутен та цефазолін і темоцилін показані при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії
995 Види Acinetobacter, Enterobacterales, види Pseudomonas та інші грамнегативні палички, що не ферментують глюкозу (крім Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia і Achromobacter xylosoxidans) з MIK 4-8 мкг/мл для меропенему, повинні інтерпретуватися на основі діагнозу. Для пацієнтів з менінгітом результат слід трактувати як резистентний. Для пацієнтів не з менінгітом результат слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"
1463 По результатам проведених тестів ізолят резистентний до карбапенемів

Delftia acidovorans	**10*4 КУО/зразок**

Експертні правила :
785 Неферментуючі глюкозу грамнегативні бактерії зазвичай від природи стійкі до пеніциліну, цефалоспоринів першого і другого поколінь, глікопептидів, фузидієвої кислоти, макролідів, лінкозамідів, стрептограмінів, рифампіну, ліпоглікопептидів та оксазолідинонів
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії
986 Для видів Morganella, видів Proteus, видів Providencia, видів Pseudomonas та інших неферментуючих глюкозу Грам-негативних паличок (окрім Acinetobacter spp.,Burkholderia cepacia,Stenomaltophilia і Achromobacter xylosoxidans) при MIC іміпенему <=4 мкг/мл слід інтрепретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"
987 Для видів Pseudomonas та інших не ферментуючих глюкозу грамнегативних паличок (крім Acinetobacter spp., Burkholderia cepacia, Stenomaltophilia і Achromobacter xylosoxidans) значення левофлоксацину MIC <=2 мкг/мл, слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції"
989 Для видів Pseudomonas та інших неферментуючих глюкозу Грам-негативних паличок (окрім Acinetobacter spp., Burkholderia cepacia, Stenomaltophilia і Achromobacter xylosoxidans) при MIC ципрофлоксацина <=0.5 мкг/мл слід інтрепретувати як "чутливий при збільшеній експозиції (I)"
1812 Даний ізолят резистентний до амоксицилін-клавуланату, так як цей препарат клінічно неефективний по відношенню до Грам-негативних неферментуючих паличок

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Serratia liquefaciens	Delftia acidovorans
Амікацин	S <=8	S <=8
Амоксицилін/клавуланат	S 8	R >16
Ампіцилін	S <=4	
Ампіцилін/сульбактам	S 4	
Цефазолін		R 16
Цефепім	S <=1	R >8
Цефтазідим	S <=1	R >8
Цефтріаксон	S <=1	
Цефуроксим		R >16
Ципрофлоксацин	S <=0.13	I <=0.13
Ертапенем	S <=0.25	
Гентаміцин	S <=2	
Іміпенем	R >8	I 4
Левофлоксацин	S <=0.5	I <=0.5
Піперацилін/тазобактам	S <=4	R >16
Триметоприм/сульфометокс	S <=2	

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. Система управління якістю сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 № UA231145 v.2