

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:	Лаб. № замовлення
Дата народж. 03.01.1955	Код замовлення: -
Стать: Жіноча	Дата замовлення: 28.09.2026 12:05
Коментар:	

Бакпосів сечі. Аероби, факультативні анаероби з ідентифікацією MALDI-TOF MS. Антибіотикограма з MIC

Дата видачі: 30.09.2026 09:44

Тип матеріалу: сеча (Б/П)

Мікроорганізм	Ступінь росту
Escherichia coli	10*6 КУО/мл

Експертні правила :

974 Цефтібутен та цефазолін і темоцилін показані при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів

975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії

983 Для E.coli та видів Klebsiella (крім K.aerogenes) значення MIC <= 4 мкг/мл для цефазоліну, слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції"

984 Для E.coli, видів Klebsiella (крім K.aerogenes), видів Raoutella та Proteus mirabilis значення MIC цефуросима <=8 мкг/мл, слід інтерпретувати як "чутливий при збільшеній експозиції"

1425 Проведений тест на виявлення продукції ESBL - негативний

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Escherichia coli
Амікацин	S <=8
Амоксицилін/клавуланат	S 4
Ампіцилін	S <=4
Ампіцилін/сульбактам	S 2
Цефазолін	I <=4
Цефепім	S <=1
Цефтазідим	S <=1
Цефтріаксон	S <=1
Цефуросим	I <=4
Ципрофлоксацин	S <=0.13
Ертапенем	S <=0.25
Гентаміцин	S <=2
Іміпенем	S <=0.25
Левовфлоксацин	S <=0.5
Меропенем	S <=0.13
Піперацилін/тазобактам	S <=4
Триметоприм/сульфометокс	S <=2