Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**
Дата народж.	18.06.1993	**Код замовлення:** -
Стать:	Жіноча	**Дата замовлення:** 22.09.2026 13:16
Коментар:		

Бакпосів із вуха. Аероби, фак. анаероби MALDI-TOF MS. АБГ з MIC

Дата видачі: 24.09.2026 09:32

Тип матеріалу: мазок із правого вуха

Мікроорганізм	Ступінь росту
Klebsiella pneumoniae	**10*7 КУО/зразок**

Маркери стійкості:
ESBL - бета-лактамаза розширеного спектру
Експертні правила:
749 Представники родини Enterobacterales, резистентні до ципрофлоксацину, також стійкі до усіх фторхінолонів
937 Результат чутливості для Enterobacterales при MIC амоксицилін-клавуланату 16 мкг/мл або 32 мкг/мл слід інтерпретувати на основі діагнозу. Для пацієнтів з неускладненою інфекцією сечовивідних шляхів результат слід інтерпретувати як "чутливий". Для пацієнтів з іншими типами інфекцій слід інтерпретувати як "резистентний"
974 Цефтібутен та цефазолін і темоцилін показані при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів
975 Аміноглікозиди часто призначаються в комбінації з іншими препаратами з метою доповнення активності аміноглікозида або розширення спектру терапії. При системних інфекціях аміноглікозид слід доповнювати іншими видами активної терапії
1403 При виявленні продукції ESBL, результати визначення чутливості до інгібіторозахищених бета-лактамів, цефаміцинів та оксацефемів необхідно змінити з категорії "чутливий" або "чутливий при збільшеній експозиції" на категорію "стійкий"
1505 Підтверджено, що ізолят продукує ESBL

Чутливість до антимікробних препаратів: S=Чутливий, I=Чутливий при збільшеній експозиції, R=Стійкий

Антибактеріальні препарати	Klebsiella pneumoniae
Амікацин	S <=8
Амоксицилін/клавуланат	R 16
Ампіцилін	R >16
Ампіцилін/сульбактам	R >8
Цефазолін	R >32
Цефепім	R >8
Цефтазідим	R >8
Цефтріаксон	R >4
Цефуроксим	R >16
Ципрофлоксацин	R 1
Ертапенем	S <=0.25
Гентаміцин	S <=2
Іміпенем	S 2
Левофлоксацин	R 1
Меропенем	S <=0.13
Піперацилін/тазобактам	R <=4
Триметоприм/сульфометокс	R >8