Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001
Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт:		**Лаб. № замовлення**	
Дата народж.	06.10.1979	**Код замовлення:**	-
Стать:	Чоловіча	**Дата замовлення:**	10.09.2026 9:53
Коментарі:			

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Фібротест/Актитест (розрахунок виконується компанією BIO PREDICTIVE (Франція))				
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT) Первинна проба: венозна кров Увага! Змінено референтні значення!	34	Од/л	< 50	
Білірубін загальний (tBIL) Первинна проба: венозна кров	10.2	мкмоль/л	5,0 - 21,0	
Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП, GGT) Первинна проба: венозна кров Увага! Змінено референтні значення!	46	Од/л	< 55	
Гаптоглобін (ГПТ,HPT), нефелометрія Первинна проба: венозна кров	**3.27***	г/л	0.36 - 1.95	Референтні значення: 0-15 д.0.01-0.11 15 д.-1 рік 0.08-2.10 1-12 років 0.08- 1.55 12-19 років 0.08- 1.70 Від 19 років 0.36-1.95
Альфа-2-макроглобулін, нефелометрія Первинна проба: венозна кров	1.54	г/л	1.04 - 2.61	
Аполіпопротеїн А1 (Apolipoprotein A1, Apo A1) Первинна проба: венозна кров	1.17	г/л	1,05 - 1,75	

Відповідальна особа
Завідувач Лабораторії клінічної біохімії Поливода А.Я.

*Символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень*

Гарантія точності та достовірності результатів досліджень
Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026
Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а
dila.ua
Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

FibroTest

SN

http://www.biopredictive.com/

Пацієнт	
Дата народження	1979-10-06
Стать	Чоловіча
Вік	46 Років

Біомаркери	
Дата взяття зразку	2026-09-10
Альфа-2-макроглобулін	1.54 g/l
Гаптоглобін	3.27 g/l (1)
Аполіпопротеїн A1	1.17 g/l
Білірубін	10 µmol/l
Гамма-ГТ	46 IU/l
АЛТ	34 IU/l

Результати тестів

FibroTest

FibroTest оцінює фіброз печінки



Оцінка: 0.15
(F0)

ActiTest

ActiTest оцінює активність запалення (за наявності хронічного вірусного гепатиту C або B)



Оцінка: 0.14
(A0)

Застереження щодо використання та інтерпретації

Достовірність результатів залежить від дотримання преаналітичних та аналітичних умов, рекомендованих BioPredictive. Аналізи потрібно відкласти через: гострий гемоліз, гострий гепатит, гостре запалення, позапечінковий холестаз. Рекомендовано проконсультуватися із фахівцем для інтерпретації при хронічному гемолізі і синдромі Жильбера. Інтерпретація тесту не підтверджена для пацієнтів з трансплантованою печінкою. За екстремальних значень одного з показників інтерпретація результатів вимагає пильної уваги та обережності.. У разі розбіжності між результатом біопсії і тестом, рекомендовано звернутися за консультацією до фахівця. Причини цих розбіжностей можуть бути пов'язані як з хибністю тесту, так і хибністю біопсії: біопсія печінки має 35% варіабельності для однієї стадії фіброзу. Рівень ALT може бути заниженим у людей з дефіцитом вітаміну B6. Це не впливає на оцінку FibroTest, але може знижувати оцінку Actitest.

FibroTest інтерпретується за наявності хронічного гепатиту B і C, алкогольного і неалкогольного стеатозу. ActiTest інтерпретується за наявності хронічних гепатитів B і C.

(1) Вказане значення дуже високе, вище 99 процентиля. Перевірте значення і відсутність сепсису. Звичайне максимальне значення : 3.2 g/l.

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.
Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.
Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.
Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Діагностичний центр ТОВ «МЛ «ДІЛА» акредитований Національним агентством з акредитації України на дослідження відповідно до ISO 15189:2022, атестат про акредитацію №30001 чинний до 18.10.2026

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а

dila.ua

Інформаційно-сервісна служба: 0 800 21 78 87

Як інтерпретувати результати тесту ?

У цьому посібнику по інтерпретації представлені всі тести компанії BioPredictive з діагностики захворювань печінки.

Використані в посібнику значення є умовними і носять пояснювальний характер.

Результат, отриманий при підрахунку вашого тесту, представлений на окремій сторінці.



FibroTest

оцінює фіброз



FibroTest визначає ступінь фіброзу:

- F0: відсутність фіброзу
- F1: портальний фіброз без утворення септ
- F2: портальний фіброз з поодинокими септами
- F3: множинні порто-центральні септи без цирозу
- F4: важкий фіброз

Фіброз: ураження, що спричинене реакцією печінки на вірус гепатиту, ожиріння або алкоголь. Печінковий фіброз – процес заміщення здорових клітин сполучною тканиною.

SteatoTest 2

оцінює стеатоз печінки



SteatoTest 2 визначає ступінь стеатозу:

- S0: стеатоз відсутній (<5%)
- S1: легкий стеатоз (але клінічно значущий) (5-33%)
- S2S3: середній та важкий стеатоз (клінічно значущий) (34-100%)

Стеатоз: накопичення жиру в печінці, спричинене метаболічними аномаліями (холестерин, тригліцериди, діабет, надмірна вага). Стеатоз – це жирова дистрофія печінки.

ActiTest

оцінює активність процесу (запалення при хронічному вірусному гепатиті С або В)



ActiTest діагностує ступінь активності запалення :

- A0: активність відсутня
- A1: мінімальна активність
- A2: помірна активність
- A3: висока активність

Активність процесу характеризує запалення печінки, яке спричинене вірусом і має різну локалізацію і ступінь ураження.

NashTest 2

оцінює неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) у пацієнтів з надмірною масою тіла, з цукровим діабетом, гіперліпідемією



NashTest 2 дозволяє визначити ступінь НАСГ:

- N0: відсутній НАСГ
- N1: низький ступінь НАСГ
- N2: помірний ступінь НАСГ
- N3: високий ступінь НАСГ

НАСГ: запалення печінки, яке пов'язане зі стеатозом (жирова дистрофія печінки). НАСГ – надмірна запальна реакція організму на накопичення жиру в печінці. Запалення може мати різну локалізацію та ступінь ураження. Запалення порівнюють із опіком.

AshTest

оцінює алкогольний стеатогепатит (АСГ) у осіб, що зловживають алкоголем



AshTest це тест, який дозволяє визначити ступінь ураження печінки алкоголем:

- H0: немає АСГ
- H1: помірний АСГ
- H2: значний АСГ
- H3: виражений АСГ

Алкогольний стеатогепатит – захворювання, викликане зловживанням алкоголю. Призводить до дегенеративних пошкоджень печінки, які мають різну ступінь ураження.

CE IVD BioPredictive, 218 Bd Saint Germain, 75007 PARIS, France

Шановний лікарю!

Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!

Результати лабораторних досліджень не є клінічним діагнозом.

Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 р. ТОВ «МЛ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001

NASH-FibroTest™ включає в себе всі перераховані вище тести.

biopredictive.com

BioPredictive S.A.
218 Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS - FRANCE
Tel : +33 1 84 79 23 90
contact@biopredictive.com

BIO Predictive

Для отримання більш докладної інформації проконсультуйтеся з вашим лікуючим лікарем.